EXPOSÉ

TITRES & TRAYAUX SCIENTIFIQUES

DU

D' ERNEST GAUCHER

Médecia des Höpitaux de Paris

PARIS
IMPRIMERIE G. CAMPROGER
45, 202 De TRÉPUSE, 45
1892



TITRES ET SERVICES

TITRES

Interne des hôpitaux de Paris (2º interne 1877). Trois fois lauréat des hôpitaux (1877, 1878, 1881).

Chef de Clinique médicale de la Faculté de Paris (1882-1884).

Préparateur des Travaux d'Histologie à la même Faculté (1880-1885). Chef du laboratoire de la Charité (1885-1890).

Médecin des hôpitaux de Paris (1886).

mederin des nopitaux de Paris (1886). Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris (Prix des thèses, médaille

de bronze, 1882). Lauréat de l'Académie de Médecine (1888, Prix Buignot. — 1890, Prix

Membre de la Société Clinique de Paris.

Saint-Paul).

Membre de la Société française de Dermatologie et Syphiligraphie.

ENSEIGNEMENT

Leçons d'histologie au laboratoire des Travaux pratiques d'Histologie de la Faculté de Médecine de Paris (1881-1886.)

Conférences de Sémeiologie à l'Hôpital Necker, en qualité de chef de Clinique de la Faculté (1882-1884).

Conférences d'amatomie pathologique et de bactériologie, en qualité de chef du laboratoire de clinique de la Charité (1886).

Conférences de Dermatologie à la Clinique des Maladies des Enfants (1884-1891).



TRAVAUX SCIENTIFIQUES

INDEX

(D'après l'ordre de date des publications)

I.	Fractures de côtes et pneumonie traumatique page	38
11.	Hydronéphrose par compression de l'uretère	40
ш.	Sacro-coxalgie et Mal de Pott Iombaire	41
IV.	Contusion de l'abdomen. Déchirure du foie et rup- ture d'un kyste hydatique du rein —	39
V.	Tuberculose pharyngo-laryngée; nécrose et fracture spontanée du cartilage thyroïde	38
VI.	Laryngo-chondrite aigüe primitive et nécrose du car- tilage thyrotde	38
VII,	Hémianesthésie et gangrène spontanée des doigts d'o- rigine nerveuse	86
VIII.	Sur deux cas d'orchite parenchymenteuse suppurée, suivie de l'issue des tubes séminifères et de la destruction totale de la glande	40

IX.	Deux observations de Mal vertébral	page	41
X	Méningo-encéphalist tuberculeuse Iocalisée autour de l'émergence du nerf facial. Hémiplégie faciale directe et complète	-	87
XI.	Atrophie et sclérose du cerveau. — Arrêt de déve- loppement. Altérations dentaires. Atrophie et contractures musculaires généralisées	_	3:
XII.	Tuberculose miliaire généralisée (cœur, pericarde, organes thoraciques et abdominaux, vésleule et voies biliaires, etc.)	_	8
XIII.	Fausse membrane diphtéritique représentant le moule interne complet de la trachée, des bronches et des ramilications bronchiques, retirée pen- dant la trachéotomie.	_	2
XIV.	Gangrène pulmonaire.	_	3
XV.	Atrophie partielle du cerveau	nere!	3
XVI.	Hydrocéphalie ventriculaire	_	. 3
XVII.	Tuberculose des voies bilisires	_	3
XVIII.	Des gommes épiphysaires	-	2
XIX.	Mélanodermie généralisée avec lésion des capsules sur- rénales chez une syphilitique		2
XX.	Cirrhose syphilitique du foie; ascite jaune-verdâtre bilieuse	_	2
XXI.	Gommes du foie et cirrhose syphilitique. Liquide ascitique vert clair, bilieux (analyse chimique)		2
XXII.	Arrêt de développement et imperforation des organes génitaux internes chez une femme de 44 ans non réglée, mais dont les ovaires étalent cou- verts de cicatrices menstruelles.		4
XXIII.	Kystes hydatiques du fole suppurés. Rupture et hé- morrhagie dans le péritoine		

XXIV.	Leucocythémie aigliep	age	39
xxv.	Démence; abcès ancien enkysté du cervelet	-	37
xxvı.	Lésion mitrale par adhérence complète des valvules	-	39
XXVII.	De l'aphasie saturnine	-	28
XXVIII.	Note sur le parasitisme de la Lèpre	-	24
XXIX. '	Rhumatisme cérébral, métastase d'un psoriasis	-	48
xxx.	Abcès volumineux du cerveau; phénomènes ty- phoides		37
XXXI.	Abobs multiples du foie, métastiques, d'origine infectieuse	_	40
XXX11	Cancer du rein droit et du péritoine		40
XXXIII.	Végétations endocardiques	-	39
XXXIV.	Hypertrophie primitive de la Rate	-	40
XXXV.	Mémoire sur l'anatomie pathologique des para- lysies diphtéritiques	_	18
XXXVI.	Note sur la pathogénie de l'albuminurie dans la diphtérie	_	14
	Note sur le parisitisme de la méningite cérébro- spinale et sur la néphrite infectieuse de cette maladie	_	14
XXXVIII	Des troubles de la nutrition dans l'intoxication saturnine; physiologie pathologique de l'em- poisonnement chronique par le plomb	_	14
XXXIX.	Mémoire sur l'anatomie pathologique de l'eczéma	-	21
XL.	Deuxième note sur les bactéries de la Lèpre	-	24
XLI.	Néphrite infectieuse et urémie dans la fièvre ty- phoïde		29
XLII.	Deux observations de néphrite cantharidienne		43

XLIII.	De l'Epithélioma primitif de la Rate	page	1
XLIV.	De la paralysie saturnine des muscles longs su- pinateurs		21
XLV.	De la péritonite sarcomateuse primitive subsigüe	-	25
XLVI.	Hypothermie dans l'intoxication alcoolique aigüe	_	41
XLVII.	Phlegmatia alba dolens dans la chlorose	-	44
XLVIII.	Observation de Syphilis cérébrale	-	44
XLIX.	Syphilis articulaire	_	44
L.	Deux observations d'ascite chyliforme (avec analyse chimique et examen microscopique)		4
LI.	Histologie pathologique de l'uréthrite blennor- rhagique	_	10
L11.	Syphilis bulbo-médullaire précoce	_	26
LIII.	Corne cutanée de la région sternale	_	24
LIV.	Sur les causes du pouls de Corrigan et du double souffle intermittent crural	_	31
LV.	Observations de paralysies dans la chorée	_	4
LVI.	Cancer primitif du pancréas	_	46
LVII.	Observation d'Erysipèle de la face dans la fièvre typhoide	_	4
LVIII.	Entérite muco-membraneuse	_	4
LIX.	Observation d'amaurose saturnine	_	43
LX.	Kyste hydatique du poumon ouvert dans la plèvre, opération de l'empyême. Guérison		4
LXI.	Syphilis héréditaire tardive et phtisie pulmonaire syphilique	_	2
LXII.	Arthropathie tibio-tarsicane tabédque		

	- 9		
LXIII.	Infection purulente d'origine puerpérale chez l'homme	page	29
LXIV.	De la nature arthritique de la Sclérodermie	_	25
LXV.	Dermatite exfoliatrice dans le cours d'une Sy- philis secondaire	_	25
LXVI.	Péritonite tuberculeuse à forme ascitique	-	45
LXVII.	Traité théorique et pratique des Maladies de la peau	_	19
LXVIII.	De la transmission de la phtisie entre époux	_	34
LXIX.	Péricardite rhumatismale ayant précédé de trois ans la première attaque de rhumatisme arti- culaire aigu	_	82
LXX.	Pathogénie des Néphrites	_	30
LXXI.	Contracture hystéro-traumatique guérie par la chloroformisation et l'application d'un appa- rell plâtré.	_	47
LXXII.	Mélanose et cancer mélanique du foie	_	47
LXXIII.	Observation d'intoxication par les œufs de poisson	_	47
LXXIV.	De la durée d'incubation de la tuberculose ino- culée	_	16
LXXV.	De la non-contagion de la pelade	-	24
LXXVI.	De la pleurésie purulente comme détermination de la grippe	_	81
LXXVII	Premier mémoire sur le traitement de l'angine diphtéritique	_	34
LXXVIII.	Deuxième observation de phlegmatia alba dolens dans la chlorose	_	44
LXXIX.	Erythème septicémique	-	48

LXXX.	Ramollissement cortical du cerveau avec épilepsie jacksonnienne		48
LXXXI.	Adénopathie axillaire tuberculeuse dans la tuber- culose pulmonaire.	_	45
LXXXII.	Note sur le pouvoir toxique de l'acide borique.	_	16
LXXXIII.	Sur l'action physiologique de l'Helwigia balsamifera.	_	16
LXXXIV.	Recherches expérimentales sur la pathogénie des Néphrites par auto-intoxication		17
LXXXV.	Pathogénie du mal de Bright	_	30
LXXXVI.	Goutte articulaire aigüe chez un enfant de 15 ans	-	32
LXXXVII.	Epistaxis de la néphrite interstitielle	_	83
LXXXVIII	Quelques applications thérapeutiques de l'acide borique	_	23
LXXXIX.	Communication à la Société des hôpitaux de mon traitement de Fangine diphtéritique		84
XC.	Deuxième communication sur le traitement de l'angine diphtéritique	_	34
XCI.	Apoplexie et aphasie hystéro-saturnines	_	45
XCII	Observation de cancer de l'utérus et de la vessie avec néphrite ascendante	_	48
XCIII.	Œdème vrai des replis aryténo-épiglottiques	_	48
XCIV	Pathogénie et métastases de l'eczéma	_	22
XCV.	Formes de la tuberculose cutanée chez les enfants.	_	28
XCVI.	Nouvelles observations sur le traitement de la diphtérie	_	35
XCVII.	Sur la contagion et la nécessité de l'isolement de la coqueluche	_	36
XCVIII.	Deux cas de diabète conjugal		36

	- 11 -		
XCIX.	Apoplexie hystérique dans la syphilis	page	45
c.	Incontinence d'urine traitée par l'électrisation du col de la vessie	_	46
CI.	Trois observations de pseudo-typholde syphilitique	_	46
CII.	Deux observations d'urticaire interne	_	46
CIII.	Epithélioma primitif des voies biliaires	-	48
CIV.	Cancer de l'estomac, du péritoine et du foie, ayant simulé une péritonite tuberculeuse	_	41
CV.	Ataxie locomotrice syphilitique guérie par le traitement spécifique	_	21
CVI.	Sur la grippe (Epidémie de 1889-90)		3
CVII.	Myosites rubéoliques	-	8
CVIII.	Cancer de l'osophage à début dyspnéique par compression de récurrents		3
CIX.	Traitement de la turberculose par l'acide borique.		3
CX.	Traitement de la diphthérie (mémoire couronné par l'Académie de médecine)		3
CXI.	Observation de cirrhose alcoolique hypertro- phique du foie guérie		4
CXII.	Hystérie alcoolique	-	4
CXIII.	Retrécissement congénital de l'artère pulmonsire considéré comme un vice de conformation.	_	4
CXIV.	Neuf observations de Rubéole	_	4
CXV.	Trachéotomie dans le cancer de l'œsophage		4
CXVI.	Ulcère perforant du Duodénum		
CXVII.	Observation de vaccine généralisée suivie de mort.		
CXVIII.	Traitement de la Diphthérie		3
CX1X.	Gangrène des extrémités bronchiques, terminée par une gangrène pulmonaire	_	4



I. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUES PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Mémoire sur l'anatomie pathologique des Paralysies diphtéritiques.

Avec une planche, hors texte, gravée d'après les dessins de l'auteur.

(Journal de l'Anatome et de la Physiologie 1881).

Ce travail (abilit que la lísion essentielle de la Paralysis dipháritique par ces une névrite des rentines sacrificares resthémens, ceraretare la disparition de la myélina, la multiplication et l'augmentation de volume des noyaux de la gate de Swan, avec inspirit complite du cylindre-sax et de la modific épatiere. Cert la preniter descripion de certs forme de retiriva, qui a été endicé pas une que nien de certain attaura, les cellules des comes américares de la modifica de la commentación de la come les cylindre-saxes de tubes nerveux; c'est pourquoi la paralysis dipháritique guérit le plus coveras, una laiser à la sujet acont coutoble de système nouvelle de posteme consolute attacts.

Note sur la l'athogénie de l'Albuminurie dans la Diphthèrie et sur la néphrite infectieuse diphthéritique.

(Rulletin de la Société de Biolorie, 1881.)

Constatation des microbes dans le sang, dans les cellules des tubuli et dans Purine. Description des lésions histologique de la néphrite de la Diphtérie.

Note sur le parasitime de la Méningite cérébro-apinale et sur la Néphrite infectieuse qui l'accompagne.

Infectieuse qui l'accompagne.

(Bulletin de la Société de Biologie 1881.)

C'est la première description de cette variété de Néphrite infectieuse, d'après la doctrine de M. Bouchard.

Des troubles de la nutrition dans l'intoxication satur-

(Mémoire publié dans la Revue de Médecine 1881; récompensé par l'Académie de Médecine, Concours du prix Buiruet, 1883.)

Physiologie pathologique de l'empoisonnement chronique par le plomb (Anémie, Ictère et Albuminurie des Saturnins), comprenant les troubles de l'élimination des substances médicamenteuses.

Mémoire reposant sur 24 observations, avec nombreuses analyses complètes des urines (dosages de l'urée, des chlorures et des phosphates; recherche de l'acide urique, des matières colorantes et dos substances médicamenteuses climinées par la secrétion urinaire.

Ce travall montre que l'intoxication assuraine produit un rélentissement de la nutrition et de la désassimilation comparable à celui de la goutte par exemple, caractérisé par l'oligarie, la dimintion de l'exercition du chlore et de l'acide phosphorique, l'absissment du chliffe de l'urée, avec augmentation parallèle de l'acide urique, en même temps qu'une déglobulission rapide qui se manifeste d'une part par les décharges de matière colorante dans Purine, d'autre part par l'ietère hémaphéique.

L'élimination des substances médicamenteuses est ralentie comme la désassimilation elle-même. Cette élimination est de plus intermittente et saccadée.

De l'Epithéliema primitif de la Rate.

Avec trois figures histologiques gravées d'après les des-

Thèse de Dochrat 1882. — (Travail récompensé par la Faculté de Médecine de Paris, Médaille de bronze).

Forme particulière d'hypertrophie idiopathique de la Rate, sans leucémie.

La lésion histologique de cette entité morbide nouvelle est constituée par le passage des éléments nucléaires de la rate à l'état de cellules épithéliales polydriques volumineuses, avec noyau et corps cellulaire distinct. Les cloisons interalvéolaires sont hyperplassées et épaissies.

Climquement, cette maladie est caractérisée par une hypertrophie énorme et primitive de la Rate (4°770), avec hypertrophie secondaire du fole, sans ascite, sans leucémie, sans hypertrophie ganglionnaire, avec hémorrhagies gingivales et cutanées et cachexie progressive.

Histologie pathologique de l'uréthrite blennorrhaglque.

(In Thèse de R. Jamain, sur l'uréthrite chronique blennorrhagique, p. 50, 51, 1888.)

Ces recherches montrent que, dans la blennorrhagie, l'épithéllium de Purèhne est intuct. La lésion est exclusivement sous-épithéliale; elle consiste d'abord dans une infiltration nucléaire, qui s'organise ultérieurement en tissu conjonctif, puis en tissu fibreux, à la période des rétrécissement.

De la durée d'incubation de la Tuberculose inoculée,

(Revue de médecine, juin 1887. — Travail du laboratoire de M. le Professeur Potain.)

Ge travail montre que la tuberculose peut ne se manifester que 25 mois après l'inoculation.

Note sur le nouveir texique de l'acide berique,

(Bulletin et mémoires de la Société médicale des Hôpilaux de Paris, Familier 1888.)

L'acide borique introduit par la vole stomacale, chez les cobayes, n'est toxique qu'à la dose quodidenne de plus de 1 gramme par kilogramme d'animat, récéte pendant plusieurs jours de suite. Il s'élimine par la sécrétion urinaire. Administré à dote toxique, l'acide borique détermine de l'albuminurie.

Sur l'action physiologique de l'Hedwigia balsamifera.

(En collaboration avec MM. Combemale et Marestang.

Complerendu de l'Académie des Sciences, 24 Septembre 1888).

Les expériences ont été faites avec les extraits aqueux et alcooliques de tiges et de racines. Elles ont prouvé que cette plante est un poison

nerveux, hypothermisant, paralysant et convulsivant, dont les effets s'étendent progressivement de l'extremité inférieure de la moelle au bulbe rachidien, Les auteurs ont retiré de leurs extraits deux substances : un alcaloide et une résine.

L'Alcaloide est surtout convulsivant; il est aussi hypothermisant et paralysam à un moindre decré que la résine.

La résine est exclusivement paralyzante et hytothermizante.

L'action paralysame de la reinite est semitale à cutte du currer, mais la done rive par teop form, Talmala que refault en la paralysie guété sans lisiser de trose. L'hypothermite produire par la rétale peut de la reinite de

Recherches expérimentales sur la Pathogénie de Néphrites par auto-intoxication.

(Revus de Médecine, Novembre 1888)

Ce travail montre que les matières extractives (leucine, tyrosine, créatine, créatinine, xanthine, hypoxanthine) produisent des néphrites toxiques épithéliales, et que les poisons animaux agissent sur le rein de la même façon que les poisons minéraux et végétaux.

Abail que je l'ài prouvé dans différents tureuse. (Pentageité de na phiène, Publequiele du mid de Bright), outes les néphrène cottogies sont den abprince ophthelistes, qu'il vigine d'introduction par les poisons den abprince ophthelistes, qu'il vigine d'introduction par les poisons den abprince production de la prince del prince de la prince

des nephrites infectieuses, déterminées par les produits solubles d'origine métroblonne, qu'on peut légitimement considérer comme des produits végéauxs. Il en est de même également, comme le montre ce travail, des néphrites déterminées par l'élimination des matières extractives; celles-ci sont de véritables néphrites toriques d'origine animal. Le type clinique de ces néphrites produites par les matières extractives et la néphrite de l'extrer parse.

II. DERMATOLOGIE ET SYPHILIGRAPHIE

Traité théorique et pratique des maladies de la peau.

(Commencé en collaboration arce HILLAIRET, e.), Grandin-S, du 665-pages, avec figures histologiques, dans le taste, gravies d après la préparations et les destins de Tauteur, et 8 planches en couleur hors inste, représentant les principales affections custantes, dayère les munlages des muntés et Polysial SS Louis, précédé de l'Anatomie et de la Physiologie normales de la Peau.

Ca traite renferme, oure l'exposé discoèque des soferiones causales, un historique spécial pour chaque safection, que l'actours a ensuyé de rendre saux i complet qu'en paraible, plus complet qu'en aucun aure convagé de ce gener. I desti important de rénumer les oploitons et les hibérois de tous les auteurs aucliens emadernes, français et etrançar, en converte de l'actoristique de l'actoristique de ces diverses opposites que voit que plusieur auteurs out décrit soes des nons différents le mise madales et que certains dermanologies et rengres ront découver récemment des affections, dont ou rouver la déscription complète dans les neces auteurs français. Comme present l'autif de cite roit ou camples. Talony Fox decit comme une maladie norvulle Englange managine, on a naure constiguende de l'Imperior to tott an long indiquie par Deregia sere observation a l'appai. Un autre exemple est collei d'une descripa papelune, le lichen. Hebrit defection papelune, le lichen. Hebrit defection forme nouvelle, le loiser descripation, e. (e.), sinsi qu'obs peut vier rendre compre par la concernate de Villan e Bantann, de Ruyer, de Banin. Toolien cample, celler als quarte affection papelune, le pretigio. Ces qu'on appelle quelquelos la l'evange de l'école de Vilenne, le province competit, que de l'Anne, et un rendre complete, considera, de l'evange de l'école de Vilenne, le province comme de l'Anne, et un rendre competit de l'ecole de Vilenne, le province comme de l'anne de l'anne comme de l'ecole de Vilenne, le province comme de l'anne ce un rendre de l'ecole de Vilenne, le province comme de l'anne ce un l'ecole de l'ecole de Vilenne, le province de l'anne de l'ecole de l'ecole de Vilenne, le province de l'anne d

Parmi les recherches originales que contien et ouvrage, il y a lieu de tient l'étude des physiques de la peux, 80 des coupes horisontailes de peux, injectés avec du bles soluble, l'austeur a découver la présence de deux réseaux, l'un profico du cértique, 'autres supérficie de papillaire. Sur des coupes perpendiculaires, on voir partir du réseau susperficiel des Sur des coupes perpendiculaires, on voir partir du réseau susperficiel des l'actives de l'active de l'active de l'active de la les papilles, rappelant un peu la disposition du lymphatique central de la villosité insestinale.

Para las affections cuancies, dont l'appoé renferme du observations nouvelles, il y a signaire neuments: l'étoed des syridants patients authorise et particulièrement des manifestations du crythous baisse authorise et particulièrement des manifestations des crythous baisse de la formation personnelles a la formation personnelles a formation de la forma

A côté des descriptions spéciales, une large place est donnée dans cet ouvrage à la pathologie générale. Le plus souvent les affections de la peau ne sont que des déterminations morbides; l'austra a dans dé disexue cente deraille question des diabless qui à cés à controresce, Asigund'hai, grâce aux propris de la microbiologie, le donnaire des diablesses se revierie de plus en plus. Deurs eprs, l'herpristure est el-trabutions se confondent dans la grande classe des maladies par raientissement de la mutrilon. La syphille set une infoction. Il ne retter donne plus comme diablesse que l'arrièritions ou diables bradyraphique de M. Bouchard est lé métadares.

La scrofule a disparu pour faire place à la tuberculose cutanée ou, dans certains cas, à la syphilis héréditaire tardive, à laquelle il faut rattacher beaucoup de ces ulcérations dites scrofuleuses par les anciens.

Dans la pathogénie des maladies de la peau, l'auteur réserve aussi une large part aux causes diététiques, à l'influence des ingesta, dont le rôle important a été si souvent méconnu.

Mémoire sur l'Anatomie pathologique de l'Eczèma.

Avec 4 planches hors texte, gravées d'après les dessins de l'auteur.

(Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie. 1881.) **

Les redurches hámologiques exposes dans en mémoir montrent que la lecision de l'eccules aou à la lois dis-migures et éjlémmiques. Le lois de deva est essatelliement conquerive ei indiammatoris, «e. e. eflit, l'écule de l

La timo de Equirorse comius. Enta une déginéeremente ou une transformation véniceues des colleus de cope manques, avec dispute de noyau cent letter no ten précise à l'accrina est observe dans beaucoup d'autre de la colleus de lorge (Volpin, Remaril, Dans in beaucoup d'autre de la colleus de la pour (Volpin, de la colleus), des répondes de la colleus sinterpaillaire, les colleus enbisent inse déplication plus avance; elle sons d'armin, ouverse les units dans los autres et le centre de la colonne interpaillaire n'est plus représent que par un rectaire ma, firegularie, note les mailles certerment de lescopyse et des gramalations. Cetta esté dans ce recisulum que se trouve la récisió dont l'accommission constitue à vésicle.

La peau eczémateuse présente encore une autre Ision, qui a été aussi de l'épideme, qui a torouve, par place, c'est le déallement en sauss de Pépideme, qui a torouve, par place, complètement s'apezi du corsp papillaire, auqueil II est d'habitude si întimement uni, même dans les cas pathologiques. Cette disjonction est due à une altération spéciale et encore inconnue de la basement-membrane.

Sur les muqueuses dermo-papillaires et notamment sur la langue, les lésions sont les mêmes; mais on observe de plus des exulcivations qui sont dues à la frazilité du revitement épithélial.

Pathogénie et Métastases de l'Eczéma, particulièrement chez les enfants.

(Congrès international de Dermatologie, Paris 1889).

Datume für revire Vancienen shorie Inmonita qui donnait pour usus al Vericina neu visitation dis sung et de humanen. Il dannet, che la maladas antiena d'ecedena, Veristence de principes rotages qui d'élimima par la passe. On sait que las maistices surques d'origine nutritive, les petions de la désantimilation ne v'éliminent pas seclement par le des maissi anni par les glandes cuntente. On nair Trindence de certain allments su rainer d'une silimentation quelonque prise en cese sur la chience de la commentation de l'accessa. Cert dermanuse semble dons réceber de le Pittalian de l'accessa. Cert dermanuse semble dons receber du le Pittalian de l'accessa. Cert dermanuse semble dons recebe dans le sang. La production excessive des marières nutrique désannisités, en désent occion que se présente comme un état morbide permanent, dépendant de troubles nutritifs constitutionnels et souvent hécéditaires. Quelque peu connues qu'elles soient dans leur essence, les altérations humorales des ecsémateux peuvent être comparées aux altérations chlimiques du sang et des humeurs qu'on observe dans le diabète, dans la goutte et dans l'urfemie.

D'après cette théorie, on voit combien il est dangereux de guérir brusquement un eczéma, car c'est l'élimination cutanée qu'on supprime du même coup, et c'est autant de matière toxique qui peut s'accumuler dans les organes internes et déterminer des accidents plus ou moins rapides et plus ou moins graves, suivant le siège de la métastase. C'est comme si vous cherchiez à guérir la diarrhée vicariante d'un brightique qui, par votre intervention, se trouve menacé d'urémie cérébrale. Les métastases de l'eczéma sont donc de véritables métortores chimiques. La conclusion pratique de cette théorie, appuyée sur de nombreuses observations relatées par l'auteur, est qu'il faut apporter beaucoup de circonspection dans le traitement d'un eczéma. Il faut habituer peu à peu l'organisme à la suppression de l'émonctoire cutané et donner le temps aux principes toxiques de prendre une autre voie d'élimination, celle de l'intestin ou celle du rein. Il est même nécessaire de provocuer cette substitution d'émonctoire, en administrant des purgatifs et des diurétiques, dont le meilleur est certainement le lait. En même temps, il faut proscrire les aliments azotés riches en matières extractives, tels que le bouillon de viande, le ius. les extraits et les poudres de viande,

Formes de la Tuberculose cutanée chez les cufants,

(Congrès international de Dermatologie. Paris 1889)

A chei du lapua, des gommes tubertueleuses et des abeis dermiques, l'auteurs décrit une novelle forme de benerollosé cinanée, à haquille i donne le non de fuberables questiendriense ; il la distingue des abeis dermiques et de l'impégio simple utienée. Cette tubertueleus puttels udéreuse ou uleéro-crusaciée était judic confondus sous le nom d'impetipe rocdess arec d'autres a factions bien différentes (impégio uleéré syphildies etc). La nature tuberculeuse de cette fésion est démonrée par les inoculairos sus animuse.

Observation de Vaccine généralisée suivie de mort, (Bulletin de la Société Française de Dernatologie, 8 Janvier 1891.)

Eruption vaccinale généralisée par infection et non par auto-inoculation, chez un enfant d'un mois. L'autopsie montre les lésions viscérales d'une maladie infectionse.

Note sur le Parasitisme de la Lèpre.

(En estlaboration avez Hillairet, Bulletin de la Scriété de Biologie, Décembre 1880).

C'est le premier travail paru en France sur le bacillus Lepva, découvert par Armauer Hansen.

Deuxième note sur les Bactéries de la Lèpre.

Travail du Laboratoire de M. le Professeur Bouchard. — Bulletin de la Société de Biologie. 1881).

De la non-Contagion de la Peiade. (Rulletin Midical. 6 April 1887)

Ce travail renferme de nombreuses observations de pelade d'origine nerveuse, qui n'ont donné lieu à aucune contagion. Chez la piupart dès peladés, on trouve soit des secidents nerveux antérieurs ou des commotions récentes, plus ou moins vives du système nerveux, soit l'existence d'un tempérament nerveux.

Corne entanée de la Région sterunie. (Bulletin de la Société clinique de Paris. 1883).

Production sébacée de trois centimètres de diamètre à la base et de dix

Production sébacée de trois centimètres de diamètre à la base et de dicentimètres de longueur.

De la nature arthritique de la Selérodermie. (Bulletin de la Société dinique de Paris, 1884.)

L'auseur cite deux cas de Sidendorphie qui montreun les rapports de l'architson eve ceste forme de selérodormie. L'un des maries il a los de l'archime, de l'uricaire chronique et de la seléroprésentait à la fois de l'archime, de l'uricaire chronique et de la selérodoctylle ; l'aute cas est en même temps une observation d'hérédique. El difficie avist de la seléro-dactylle, la mère outre sa seléro-dactylle avait du rhumatisme chronique.

Des Gommes éplphysaires.

(Bulletin de la Société clinique de Paris, 1879.)

Ce travail renferme quatre observations de gommes syphilitiques des épiphyses articulaires, qui constituent une suriété spéciale d'arthropathie suphilitime tertiaire.

Dermatite exfollatrice dans le cours d'une Syphilis secondaire.

Bulletin de la Société clinique de Paris. 1884).

Mélanodermie généralisée avec lésion des capsules surrénales, chez une syphilitique,

Bulletin de la Société de clinique de Paris. 1879).

Cirrhose syphilitique du Foie; Ascite verdâtre.

Bulletin de la Société anatomique. 1879).

Le liquide ascitique, retiré par la ponetion de l'abdomen, présentait une coloration jaune-verdâtre, quolque d'un aspect très limpide; cette coloration était due à la présence de matières colorantes de la bile.

Commes du Poie et Cirrhose syphilitique; Liquide ascitique vert-clair,

(Bulletin de la Société anatomique, 1879).

Le liquide ascitique, retiré par la ponction, était vert-clair. Comme dans le cas précédent, il renfermait des matières colorantes de la bile, qui ont été analysées chimiquement.

Ces deux observations apportent un nouvel détiennt séméologique dans le diagnostic de Pascire et de la cirrhose; çar le liquide action de la cirrhose; que le liquide action que de la cirrhose alcoolique ne présente jamais cette coloration spécialque; je le reconnais, n'est pas constante dans la cirrhose syphilique; mais, quand on trouvera cette ascite verdêtre, dans le cas de doute Il fauder poners à la syphilique doir partie de la syphilique de la syphilique doir partie de la symbol de la constant de

Syphllis bulbo-médullaire précoce.

(Revue de médecine, 1883).

Il s'agit d'un malade qui, six mois après le chancre, fut pris d'accidents nerveux progressifs, ressemblant d'abord à l'ataxle locomotrice puis à la paralysic labio-glosso-laryngée, accidents qui guérirent rapidement par le traitement spécifique.

Ataxie locomotrice syphilitique guérle par le traitement spécifique.

Bulletin de la Société Française de Dermatologie, 10 Juillet 1890).

Atazie locomotrice parsaitement caractérisée, ayant débuté quatre ans avenue syphilis non traitée. Sa nature syphilique est méconnue pendan trois ans, pendant lesquels le malade est soigné par plusieurs médecins pour une atazie locomotrice ordinaire, et néanmoins le tabes guérit en deux mois par le traitement spécifisme. Syphilis héréditaire tardive et phthisie pulmonaire syphilitique.

En collaboration avec le D' Dubousquet. — Revus de médecine 1884).

Ches une petits fills de huit ans et denl, soignés depuis longamps pour une tuberculos pelinounier, seu estjane estudiere, sepacerazion, etc., et pour un abele sostificant costal, les alártations dennitres firme penere à une syphilis hérédirier tendive. Le trustement spécifique annea une guéricon rapide de la lécito pulmonaire et de la lécito petroitaque costate, qui destu une goman. Le diagnostie de syphilis peulmonaire fat confirmé quelque temps après, par l'examen dus père derfante, qui présentait econcé des accidents syphilitiques terrilaires.

Cette observation a été reproduite dans l'ouvrage de M. le professeur Fournier sur la syphilis héréditaire tardive.

III. MÉDECINE GÉNÉRALE ET THÉRAPEUTIQUE

De l'Aphasie saturnine.

Bulletin de la Société clinioue de Paris, - April 1880).

Observation d'aphasie transitoire dans le cours d'une intoxication saturnine professionnelle. Cette aphasie est attribuée par l'auteur à l'action directe du plomb sur les cellules cérébrales. C'est la première description de cette variéé d'aphasie.

De la Paralysie saturnine des muscles longs supinateurs. (Bulletin de la Société clinique de Parie, 1882).

Deux observations de paralysie saturnine des extenseurs avec paralysie des longs supinateurs.

De la Péritonite sarcomateuse primitive subalgue, (Bulletin de la Société clinique de Paris, 1882).

Sous ce nom, l'auteur décrit une maladie caractérisée cliniquement par des symptômes semblables à ceux d'une péritonite tuberculeuse à marche rapide et à forme ascitique, avec ascite sanguinolente. Anatomiquement, on trouve toute la séreuse péritonéale, pariétale et viscérale. recouverte de bourgeons sarcomateux très vasculaires, d'aspect framboisé, semblables à des bourgeons charnus. Histologiquement, ces bourgeons sont constitués par une accumulation de noyaux embryonnaires ou embryoplastiques (sarcôme globo-cellulaire). C'est une sorte de néordasie sarcomateuse diffuse du péritoine, bien distincte des sarcômes limités sous forme de tumeurs.

Arthropathic tibio-tarsienne tabétique. Avec figure dans le texte.

(En collaboration avec M. Duffseq - Revue de médecine, 1884),

C'est la première observation publiée d'arthropathie tabétique, siégeant dans l'articulation tibio-péronéo-tarsienne.

Infection purulente d'origine puerpérale chez l'homme. (Ex collaboration auec M. Boursier. — Revus de médecias, 1884).

Observation d'infection purulente chez un homme, qui avait soigné sa femme morte de fièvre puerpérale.

Nephrite Infecticuse et Uremie dans la Fièvre typhoïde. (En collaboration over M. A. Robert. - Revue de médecine, 1881).

Pathogénie des Néphrites,

(Thèse d'Agrégation 1886. — O. Doin, Éditeur).

Ce revuil renforme, outre la pathogicia de soutes is formes de na phirica, une desto compilet en arightires infectieuses et et en chiptiries moziques, avue den recherches personnelles, histologiques et experimentes, avez deut recherches personnelles, histologiques et experimentes, avez qualques-mens de ces naphrires. Parmi les naphrires intensissesses, comprises d'appès la doctrine de M. Bouchard, Fauser d'unifer sistement de la mémpire cércher-opsainet, des creditions, de la personnelle infectieuse, etc. Parmi les naphrires mellages, de la presumonie infectieuse, etc. Parmi les neces de la presentation de la pres

Fletère garva.

Cet ouvrage contient de plus des vues nouvelles sur la pathogénie du mal de Bright, la description de la néphrite goutreuse, des lésions du crien dans le débère sucré, des néphrites expérimentales par ligature de l'urebre, de l'arrère et de la veine rénate, des néphrites aspérimentales par ligature de l'urebre, de l'arrère et de la veine rénate, des néphrites ascendantes, etc., et une classification des néphrites haufes sur la nobezofaire.

Pathogénie du mal de Bright.

(Bulletin et mémoires de la Société médicale des hépitaux de Paris, 13 Janvier 1888).

Dans es traval, le ma de Bright en evotagi, comme la résulta d'un suit-échtoriste Noupeup per la santier content, le participelen seus cunnicé es focilien de malière extractives. Par l'injection seus cunnicé es focilien de malière extractives, le participele suite les animans, de naphrites ciphicilles companieles sus port neils blace. Il men l'Idée que certifien forma de mal de Brights tous dues à la présent en ractée de ce solutionnes extractives, réclaime d'une condominant seus en catée de ce solutionnes extractives, réclaime d'une condominant seus en catée de ce solutionnes extractives, réclaime d'une controllés de toutes les mahalles chroniques, de la l'évent de la controllés de l'active prese s'en mêmes solutionnes per l'aliennation. Le réglérate de l'active greve s'en connait sous une forme aigue une pathogénie semblable; il en ex de mûnte des népřires chroniques qu'on peut observer comme complication de certaines maladies du foite. Dans la néphrite interstitielle primitive ou selérous artifeille du rein, ces matéres extractives peuvent irriter les épitheliums secréteurs, et c'est sans doute à leur action qu'il faut attribuer les complications épithéliales qu'on observe en parell aux et la production de ce qu'on a appelé la néphrite mixte.

La consequence there executes the control of the co

De la Pleuresie purulente comme détermination de la grippe.

(Bulletia et mémoires de la Société médicale des hépitaux de Paris, 20 Juillet 1887).

Deux cas de pleurésies purulentes primitives, survenues à la suite de congestions pleuro-pulmonaires grippales, dans le cours d'une épidémie de grippe. Guérison par l'opération de l'empyème.

Sur la Grippe, (Épidémie de 1889-1890).

(Bulletia et minoires de la Société médicale des hépitaux de Paris. — 14 Mars 1890).

Observations personnelles des principaux cas. Formes rares : pseudoméningite, névralgie faciale, thyroidite, suppurations cutanées, forme infectieuse adynamique etc. — Etude anatomo-pathologique et bactériolagique de la broncho-pneumonie grippale pseudo-lobaire.

Myosites rubéoliques.

Arec planche.

(En collaboration avec M. Mariage, — Bulletin et wémoires de la Société wédicale des hépitaux de Paris, 13 Juin 1890).

C'est la première observation publiée de sugesites infectionnes dans la resquele. Ce sont des sugesites selieruses, tantôt atrophiques, tantôt hypertrophiques.

Cancer de l'œsophage à début dyspnéique.

(En collaboration unce M. Potel. — Bulletin et ministres de la Société médicale des bénitaux de Paris. 18 Juillet 1880).

Longemps avant de produire la gêne de la déglutition, le cancer de Pusophage peut, par irritation et compression des récurrents, déseminer des phénomènes laryngés, du cornage et des accès de suffocation qui nécessitent la trachétomie. L'Opération, dans ce cas, peut permettre une survie assez longue.

Ce début périphérique du cancer de l'œsophage appartient au cancer en nappe, qui prend naissance dans un diverticule glandulaire et n'envahile que postérieurement la muqueuse du canal œsophagien, sur laquelle il s'étend en surface, avant de déterminer la coarctation du conduit.

Goutte articulaire algue chez un enfant de 15 ans.

(Bulletin et missoires de la Société médicale des hépitanes de Paris.

22 Join 1888).

Epistaxis graves comme première manifestation d'une néphrite insterstitielle.

(Bulletin et missoires de la Société socideale des hépitaux de Paris. 22 Juin 1888).

Quelques applications thérapeutiques de l'acide borique. (Bulletin et missoires de la Société médicale des hépitaux de Paris, 27 Janvier 1888.)

L'auteur montre, par de nombreuses observations, que l'acide borique st, en quelque sorte, le médicament spécifique de l'impetigo. Il l'a de plus employé avec succès, comme topique, dans plusieurs cas d'ulcérations tuberculeuses de la peau.

A l'intérieur, dans la tuberculose pulmonaire, l'acide borique peut-être administré avec avantage; il diminue l'expectoration, la rend plus fluide, flui disparaire la fédidié des carchants, prévint la diarrhée et a semblé, dans quelques cas, arrêter l'évolution des lésions.

Traitement de la Tuberculose par l'acide borique. (Bulletis Midical, 10 Aoist 1890.)

L'auteur montre que l'acide borique, administré par les voies digentives, s'élimine par la sécretion urinaire et aussi, en quantité très appréciable, par l'expectoration. C'est donc une raison de l'employer comme antiseptique dans la tuberculose pulmonaire. L'auteur a inicest d'inectement dans un des poumons, chez des lapins,

L'auteur a injecté directement dans un des poumons, ches des lapins, quelques gouttes de culture pure de tuberculose s'airie, provenant du laboratoire de M. Necard (d'Alfort), es a réussi, de cette façon, à produire une tuberculose pulmonaire locale qui est devenue cacésues, sans se généraliser. D'autres lapins, inoculés comme les précédents, ont été soumis à l'usage de l'acide borique, à la dose de 0,20 centigrammes par four, es la tuberculose ne s'est pas dévelopére chez avoir.

Au point de vue pratique, dans un certain nombre de cas, l'acide

borique a paru arrêter l'évolution des lésions pulmonaires, chez des malades observés par l'auteur depuis six ans et qui sont restés dans un état satisfaisant.

De la transmission de la Phtisie entre époux.

(Legons cliniques de M. le professeur Potain, rédigies et publiles par le docteur Gamber. — Revue de Médecine, 1885.)

Sur une méthode de traitement de l'Angine diphtéritique par l'ablation des fausses membranes et la cantérisation antiseptique de la muqueuse sons-jacente.

> (Annales de Laryngologie, Désembrs 1887, -- et Bulletin et Minnires de la Société Médicale des hépitaux de Parus, 27 Janvier 1888.)

L'uneur contaéteux, constriennes à l'opision régaune à ceut époque, que, dans la diplotéis, la fausse-membrane est pour sinsi deux époque, que, dans la diplotéis, la fausse-membrane pour sinsi deux gress ses offorts. Su méthode de reinneme comine, à culerer les fausses-membranes et à cautérière la grege neve un caussique noisique, dont l'action évient. Tilaction galende. Il emploté, dans ce but, une selution concentrée alcoulque d'actie phémique, additionale emplore d'aductie turique et évende d'unelle. Il associa è ces cuntérisations de grandes irrigatei et onde d'unelle associa è ces cuntérisations de grandes irrigations phéniquées. Sur 17 cas graves, Il

Deuxlème communication sur le traitement de l'Angine diphtéritique.

(Bulletin et mensoires de la Société médicale des hépitaux de Paris. Octobre 1888.)

Statistique de 91 cas nouveaux, traités par d'autres médecins, d'après la méthode du docteur Gaucher. Emploi de ce traitement chez des enfants de tout âge. Sur ces 81 cas, il n'y a ou que quatre décès par eroup.

Nouvelles observations sur le traitement de la Diphtèrie. (Bulletin et mémoires de la Société médicale des hépitouz de Paris,

9 Acid 1889.)

Pertectionnements de la méthode. Formule définitive du topique

Statistique personnelle de 42 cas; 3 décès.

Traitement de la Diphtérie par la méthode du Docteur Gaucher.

(Mémoire pour le priz St-Paul (1890), couronné par l'Académie de médecine.)

Traitement de la Diphtérie.

(Médecine moderne. Octobre 1891.)

L'auteur rappelle les principes de sa méthode, esponés dans son premier mémotre de 1887. Les idées thorôques qui l'on guidé dans la conception de son traitement, après avoir été fort contenées, sont admites aujourd'hui par tous et ont éé confirmées par les traveux de laboratoire. Personne ne met plus en doure sujourd'hui la nécessié d'enlever les fausses-membranes phatryngées et d'uppliquer à la diphiterle un traitement amiseptique. Le mellleur antiseptique, dans et ces aper Faciés phénique. La mixture formulée par l'auteur reste supérieure à la glycérine phéniquée et à la solution de phénol dans l'acide sulforicinique, préparations qu'il a d'ailleurs employées lui-même avant tous les autres.

qu'il a' un mercre-apprégé ou soit à l'amand a pérsoire désillé de ses L'autres de l'autres en pour les des l'autres de l'aut

La statistique personnelle de l'auteur, jusqu'à ce jour, présente une mortalité de 8 pour cent; dans ce pourcentage des décès, il y a environ la moitié de croups opérés.

Sur la contagion et la nécessité de l'isolement de la Coqueinche.

(Bulletin et mémoires de la Société médicale des hépitaux de Paris. 1889.)

Denx cas de Diabète conjugai.

(Bulletin et minoires de la Société médicale des hépitaux de Paris. 1889.)

A propos de la communication de M. le Professeur Debove sur ce sujet.

Hémianesthèsie et Gangrène spontauée des doigts d'origine nerveuse,

(Bulletin de la Société clinique de Paris, 1878).

Méningo-encéphalite tubereniense localisée autour de l'émergence du nerf facial ; Hémipiégie faciale, directe et complète.

Atrophie et sciérose du cerveau. — Sature prématurée des os du crâne; Arrêt de développement des os maxillaires et altérations dentaires, — Atrophie et contractures musculaires généralisées.

Atrophie partielle du cerveau, portant sur certaines circonvolutions.

Hydrocéphalie ventrieniaire.

Démence ; Abcès ancien enkysté du cervelet.

Abcès voiuminenx du cervenu; phénomènes typhoïdes. (Bulletin de la Société anatomique, 1881.) Laryngo - chendrite (aigue primitive et nécrose du cartiinge typhoïde. — Abcès ossifinent ayant fusé ie iong de la colonne vertébraie insque dans le médiastiu.

(Bulletin de la Société clinique de Paris. 1878.)

Tuberculose pharyngo-iaryngée; nécrose et fracture spontanée du cartilage thyroïde.

(Bulletin de la Société anatomique, 1878.)

Fausse-membrane diphtéritique, représentant le moule interne complet de la trachée, des bronches et des ramiflentions bronchiques, retirée pendant la trachéotomie.

(Bulletin de la Société anatomique. 1879.)

Fractures de côtes et Pueumonie tranmatique: Fracture

ancienne, eleatrisée de la voûte crânienne, (Bullein de la Syciéti anatomique, 1878.)

(Bulletin de la Société anatomique, 1878.)

Gangrène pnimonaire.
(Bulletin de la Société anatomique, 1879.)

Tubereniose miliaire du eœur, du péricarde, des plêvres des poumons, des ganglions bronchiques, du péritoine, de l'intestis, du foie, de la vésicule, des voies biliaires, de la rate et des reins.

(Bulletin de la Société anatomique, 1879.)

Pericardite rhumatismale ayant précède de trois aus la première attaque de rhumatisme articulaire aigu.

(Bulletin de la Société clinique, 1885.)

Léslon mitrale par adhérence complète des valvales

(Bullstin de la Société anatomique. 1880.)

Wegetations endocardlques.
(Bulletin de la Switti anatomione, 1881.)

Sur les causes du pouls de Corrigan et du double souffie intermittent crural, d'après M. le Professeur Potain.

(Bulletin de la Société clinique de Paris, 1883.)

Leucocythèmic algüe.

(Bulletin de la Scriété anatomique, 1880.)

Contusion de l'abdomeu. — Dochirnre du tole et rupture d'un kyste hydatique du rein. — Mort rapide.

(Bulbtin de la Société anntomique. 1878.)

Tuberculose des voles billaires.

(Bullstin de la Société anatomique, 1879.)

Kystes hydatiques du foie suppurés; rupture et hémorrhagie abondaute dans la cavité péritouéale.

(Bulletin de la Société anatomique. 1880.)

Abcès multiples du foie, présentant l'appareuce des abcès métastatiques, d'origine jufectionse probable mais inconnue,

(Bulletin de la Sseitté anatomique, 1881.)

Hypertrophie primitive de la Rate.

(Bulletin de la Société anatomique, 1881. Pièce déposée au musée Dupuytren.)

Hydronéphrose par compression de l'uretère (Compression par un abcès ossifiuent d'un mai de Pott.)

Symphyse cardiaque complète.

(Bulletin de la Société anatomique, 1878.)

Caucer du rein droit et du péritoine. (Bulletin de la Société anatomique. 1881.)

Sur deux cas d'orchite parenchymateuse, bleunorrhagique, suppurée, suivie de l'issue des tubes sémifères et de

(Bullstin de la Société clinique, 1878.)

ia destruction totale de la glande.

Arrêt de développement et imperforation de Pateras, avec absence complète de cavité ntérine et imperforation des ovidnetes, chez une femme de 44 ans. dont les ovaires étaient normanx et couverts de cleatrices menstruelles, et qui n'avait jamais été réglée.

(Bulletin de la Société anatomique, 1880.)

Sacro-Coxalgie et Mal de Pott iombaire. (Bulletin de la Société anatomique, 1878.)

Hypothermie dans l'intoxication alcoolique aigue.
(Bulletin de la Secité clinique de Paris. 1882.)



IV. - OBSERVATIONS DIVERSES

publiées dans les thèses suivantes :

Deux observations de Mul vertébral. (Thèse d'agrégation de G. Puel. 1878.)

Observation de Rhumatisme cérébral survenu brusquemeut à la suite de la guérison d'un psoriasis.

(Thèse d'agrégation de M. Quinquaud sur les Métastases. 1880.)

Denx observations de Néphrite cantharidienne. (Thèse de A. Nicolas. 1881.)

Observation de Phlegmatia alba dotens dans la chlorose. (Thète de F. Bernard. 1882.)

L'auteur a présenté une seconde observation de cette complication de la chlorose à la Société Médicale des hépitaux de Paris. 1887.

Observation de Syphilis cérébrale.

(Thèse de S. Bernheim. 1882.)

Observations de Syphilis articulaire.

(Thèses de Méricamp. 1882. et de Defontame. 1883.)

Denx observations d'ascite chyliforme, avec analyse chimique & examen microscopique du liquide.

(Thèse de F. Veil. 1882.)

Observations de Paralysies chez les choréiques. (Thise de G. Olling, 1883.)

Observation du Cancer primitif du pancrèns. (Thèse de Ch. Madre. 1883.)

Observation d'Erysipèle de la face dans la fièvre typhoïde.

(Thèse de W. Gérente, 1883.)

Observation d'Entérite muco-membraneuse.

(Thèse de G. Issard, 1883.)

Observation d'Amaurose saturnine. (Thèse de G. Weber. 1883.)

Observation de Kyste hydatique du poumon onvert dans la plèvre; opération de l'emplème. Guérison.

(Thèse de Ch. Lehmann, 1883.)

Observation de Péritonite tuberculeuse à forme ascitique.

(Thèse de V. Biat. 1884.)

Observation d'Adénopathie axillaire tuberculense dans la tuberculose pulmonaire.

(Thèse de Sanchez-Toledo, 1887.)

Observation d'Hystèrie saturnine ; Rémiplègie ; Rémianesthèsie ; Apoplexie hystèrique & Aphasie.

(Thèse de C. Hischmann, 1888.)

Observation d'Apoplexie hystérique dans la Syphilis. (Thine de Rouby, 1889.)

(There ar Rows), 1005,

Observation d'incontinence d'urine traitée par l'électrisation du col de la vessie.

(Thèse de Louis Guinon sur les troubles urinaires de l'enfance, 1989.)

Trois observations de Pseudo-Typhoïde syphilitique.

(Thise de Vialancix sur la fievre syphilitique de la période secondaire, 1889.)

Deux observations d'Urticaire interne.

(Thèse de Crouslé. 1889.)

Observation de cirrhose alcoolique hypertrophique guérle,

(Thèse de Doward, 1890.)

(Zatas as Domara, 1000.

V. — TRAVAUX & OBSERVATIONS PROVENANT DES SERVICES HOSPITALIERS DII D' GALICHER

Observation de contracture hystéro-tranmatique (pled-bot varus équin), guérie par la chloroformisation, l'application d'un apparell plâtré et le massage. (Thire de G. Ronard, 1888.)

(These de G. Renard. 1886.)

Observation de Mélanose & de Caucer mélanique du foie.

(Présentée à la Société clinique de Parss par M. Belin, interne du service. 1886.)

Observation d'intexication par les œufs de poisson.

(Présentée à la Société climque de Paris par M. Belin, interne du service. 1886.) Rapports des éraptions cutanées avec les supparations. — Erythèmes septicemiques.

cy incines sept.	recounty west.		
(Thèse de	M. Laumet, ir	interne du serve	ce. 1887.

Observation de ramoilissement cortical du cerveau avec épilepsie Jacksonnieune,

(Présentée à la Société anatomique par M. Legueu, interne du seronce. 1887.)

Observation de Cancer de l'utérus et de la vessie, avec néphrite ascendante.

(Présentée à la Société anatomique par M. Renault, interne du service, 1888.)

Observation d'ædème vrai des repiis aryténo-épigiottiques. — Tuberculose puimonaire. — Trachéotomic.

> Présentée à la Société anatomique par M. Renault, interne du service. Mai 1888.)

Observation d'Epithéliona primitif des voles biliaires.

(Présentée à la Société anatomique par M. Maurin, interne du service, Novembre 1889.)

Observation du Cancer de l'estomac, du péritoine et du foie, nyant simulé une péritonite tubercuieuse.

(Présentée à la Société anatomique par M. Maurin, interne du service. Novembre 1889.)

De	l'Hystérie	alcooliqu	e (une	observation).
	(Thire de	Salmeron	1060.3	

Retrècissement congénital de l'artère pulmonaire considéré comme un vice de conformation (une observation).

(Thèse de J. Monnier. 1890.)

De la Rubeole (nenf observations).

(Thèse de Lazard, 1890,)

De la Trachéotomie dans le cancer de l'esophage. (Thise de Goisque. 1890.)

(I'mo in Gongie: Ioioi)

De l'Uleère perforant du Duodénum (une observation),

(Thèse de Le Renard. 1891.)

De la Gangrène pulmonaire comme terminaison de la Gangrène des extrémités bronchiques (une observation).

(These de Moitier sur la bronchite putride. 1891.)